

長野赤十字病院病後児保育室ゆりかご利用判断基準

病名	病後児保育のめやす
コロナウイルス感染症	発症した日を0日として5日経過し、かつ症状が軽快して24時間経過するまで
インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
麻疹	解熱後3日を経過している
風疹	解熱し、発疹が消失している（発疹出現後3日程度、色素沈着はかまわない）
水痘	全ての発疹が痂皮化している（発疹出現から7日前後）
おたふくかぜ	耳下腺の腫大がほぼ消失している
突発性発疹	診断がくだされ、解熱している
ヘルパンギーナ	解熱して食事が摂取可能である
手足口病	解熱して食事が摂取可能で、発疹が消失している
感染性胃腸炎（ノロウイルス、アデノウイルス・ロタウイルス等）	発熱・嘔吐がなく、下痢が消失傾向である
咽頭結膜熱（プール熱）	解熱後2日を経過し、眼脂・流涙がほぼ消失している
流行性角結膜炎	眼脂・流涙などの症状がほぼ消失している（通常発症から2～3週間位）
急性出血性結膜炎	眼脂・流涙がほぼ消失している
溶連菌感染症	適切な治療を前日までに開始されていて（内服開始後24時間以上経過している）体温が38.0℃未満であること。
とびひ	発熱がなく、状態が悪くない場合
百日咳	レプリーゼが減少傾向になっている 治療効果があるとされる薬剤を最低5日間投与されている
外科的疾患	一般保育所での保育が困難な場合

*RSウイルス感染症・インフルエンザについて

周辺流行状況を確認し、鼻汁・喘鳴の強い時は要相談。 検査後陰性であることが望ましい

*上記の疾患に加えて、「頭ジラミ」がある場合は、相談を必要とする

一般的症状

熱	解熱剤等使用せずに体温が38℃未満である
食欲	半分程度は摂取できている
消化器症状	強い腹痛がなく、嘔吐もほぼない 激しい下痢もない

*免疫抑制剤（プレドニン等）を内服中の方は、申し出をお願いします。

※ 利用基準は上記によりますが、かかりつけの医師の意見を尊重します。

連絡先、お問合せ先

長野赤十字病院 病後児保育室ゆりかご

〒380-8582

長野市若里五丁目22番1号

TEL 026-226-7753

（ゆりかご直通）

又は 026-226-4131

（病院代表）